

مرض تصمغ اشجار الحمضيات

الاعراض:-

تظهر الاعراض على الجذور الرئيسية على شكل تقرحات تشمل القشرة حتى تصل الخشب كذلك تحصل الاصابة على الاشجار الكبيرة في منطقة التطعيم. يتقدم الاصابة تتصلب القشرة وتتشقق طوليا ومع تطور المرض تظهر كميات من الصمغ مما يؤدي الى اصفرار الاوراق وسقوط ازهار الشجرة وبالنهية تؤدي الى موت الشجرة.

الظروف المناسبة:-

درجات الحرارة المعتدلة وارتفاع رطوبة التربة وانخفاض حموضتها بالإضافة الى وجود جروح في جذع الشجرة والافرع الرئيسية

الوقاية والمكافحة:-

1. زراعة اصول مقاومة مثل الخشخاش والفولكاماريانا

2. ان تكون منطقة التحام الطعم بالاصل على ارتفاع لا يقل عن 30سم عند زراعة الاشغال بالارض المستديمة

3. تجنب حدوث اضرار ميكانيكية لجذع الشجرة والافرع الرئيسية والجذور

4. عمل مصاطب حقلية حول جذع الشجرة لمنع مياه الري من ملامسة الشجرة

5. مراقبة الاشجار باستمرار وكشف اسفل الساق لمعرفة الاصابة في بداية حدوثها حتى تسهل مكافحتها

6. عند الاصابة تقشط جزء من الانسجة المصابة بواسطة سكين حاد مع إزالة جزء من الانسجة السليمة ثم تدهن بمحلول فطري نحاسي

7. طلاء سيقان اشجار الحمضيات سنويا بمحلول بوردو المكون من 2 كغم كبريتات النحاس:

5كغم جير: 10 لتر ماء

8. معاملة التربة بعد خلع الاشجار المصابة باحدى المعقمات الكيماوية او المبيدات الفطرية النحاسية.

مرض تصمغ الاغصان

يعتبر هذا المرض من الامراض المهمة في الاراضي الخصبة جدا والاراضي المنخفضة ورديئة الصرف ويظهر تأثير المرض على المحصول لانه يصيب الاغصان التي تحمل الثمار

الاعراض والاضرار:-

• ذبول الاوراق الفجائي

• ذبول الاغصان الصغيرة الطرفية وموتها على مسافة 30-60سم من القمة

• تمزق القلف عند قاعدة الاغصان الميتة وتفرز الجروح التي قد تحدث كميات كبيرة من الصمغ

• في الظروف المناسبة يمتد المرض حتى يشمل الشجرة جميعها خاصة الاشجار الصغيرة

• قد لا يصاحب الذبول احيانا افرازات صمغية

الوقاية والمكافحة:-

1- تقوية الاشجار عن طريق تسميدها والاعتناء بتصريف المياه الزائدة بالري

2- قص الافرع المصابة وحرقها مع طلاء مكان القص بالبوردو

عفن الثمار الاسود

الاعراض:-

وجود بقع سوداء على سطح الثمرة وخاصة نهاية الثمرة كذلك يصيب جميع اصناف الحمضيات خاصة ثمار برتقال ابوصرة كما يزيد انتشار هذا المرض عند وجود جروح على سطح الثمرة

والقطف السيء

تقليل الإصابة من المرض:-

- 1- القطف الجيد وعدم احدث جروح للثمار
- 2- رش الافرع والثمار القريبة من سطح التربة بمحلول بوردو او أي مادة نحاسية خاصة عند الرغبة في تاخير المحصول على الاشجار
- 3- تخزين الثمار في ظروف جيدة وملائمة ودرجات حرارة منخفضة نسبيا وابعاد الثمار المصابة ان وجدت

عفن الثمار الاخضر والازرق:-

الاعراض:-

ان مرض العفن الاخضر يصيب أي جزء من سطح الثمرة تعرض لخدش او جرح ويسبب تلف للثمار وظهور زغب ابيض يتبعه ظهور طبقة من جراثيم الفطر الملونة باللون الاخضر الزيتوني. اما العفن الازرق نفس اعراض العفن الاخضر الا انه اكثر واسرع انتشارا وتكون لون المنطقة المصابة لونها ازرق.

الظروف الملائمة للأمراض السابقة:-

- 1- وجود جروح على سطح الثمار او كدمات تسرع في عملية انتشار الفطر
 - 2- ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية المحيطة بالاشجار والثمار
 - 3- توفر درجات الحرارة المثلى لنمو الفطريات
- الوقاية والعلاج:-

- القطف الجيد وعدم احدث جروح وعدم هز الاشجار لاسقاط الثمار
- جمع الثمار باستعمال اكياس خاصة للجمع
- استخدام مواد مطهرة لتعقيم الثمار اثناء التجهيز
- تجفيف الثمار وعدم تركها مبللة
- تعبئة الثمار في صناديق خاصة دون ضغط

مرض جفاف الافرع:-

الاعراض:-

جفاف الافرع العالية, وتساقط الاوراق والثمار, ويسبب كثير من الاضرار لدرجة موت اشجار كثيرة في نفس المنطقة. ويسبب هذا المرض الفطر *tracheiphila Deuterophoma* الذي يهاجم نسيج الخشب, ويتسبب بموت الافرع من النموات الطرفية الى الاسفل. العوامل التي تزيد من ضرر هذا المرض:-

- 1- الرياح الشديدة
 - 2- التربة السيئة الصرف
 - 3- قلوية التربة
 - 4- وجود املاح زائدة بالتربة
 - 5- زيادة التسميد اللازوتي والتصويم الشديد
- الوقاية والعلاج

- 1- إزالة الافرع المصابة وحرقها
 - 2- تغذية الاشجار وتقويتها
 - 3- تحسين الصرف وتقليل كميات الري للتربة سيئة الصرف (الثقيلة)
- رش الاشجار خاصة الليمون والكلمنتينا وجميع الاصناف سهلة التقشير (لان هذه الاصناف تزيد الإصابة بهذا المرض) بمحلول بوردو او مركب نحاسي مرتين الاولى شهر (10-11) والثانية شهر (4-5)

التدهور السريع) التريستيزا)

الاعراض:-

- ضعف نمو الشجرة وتدهورها ثم موتها في فترة وجيزة تتراوح ما بين 2-8 سنوات
- تفقد الاوراق لونها الاخضر اللامع ليصبح اخضر مصفر غير لامع
- تزهير الاشجار الصغيرة والاثمار المبكر والاسراع في النضج وصغر حجم الثمار
- تساقط الاوراق تدريجيا وتجف الاغصان المعراة من الورق من القمة الى الاسفل ثم تموت
- الإصابة بهذا المرض يسبب تعطيل المواد الكربوهيدراتية الى الجذور وبذلك تموت الجذور
- التعرف على الاشجار المشتبه في اصابته
- 1-تحديد ومعرفة الاصل المستعمل
- 2-اختبار وجود النشا اعلى واسفل منطقة التطعيم وذلك لانسداد الاوعية وعدم وصول النشا الى اسفل منطقة التطعيم
- 3-الكشف على الجذور والتأكد من حيويتها فاذا كانت متعفنة يزيد من احتمال الإصابة
- 4-للتأكد من الإصابة بهذا المرض للاشجار المشتبه بها نأخذ عيون منها وتطعم من شتلات ليمون البنزهير وبعد (5-2) أسابيع من التطعيم تزال قشور النموات ويفحص مكان القشور فاذا ظهرت عليها حالة تنقير كان هذا دليلا على الإصابة بمرض التريستيزا
- 5-كشط اللحاء في منطقة التطعيم للاشجار المشتبه بها وملاحظة تنقير في الخشب وپروزات في اللحاء.

الوقاية من الإصابة بهذا المرض:-

- لا يوجد علاج للاشجار المشتبه بها وينصح خلعها وحرقها
- الوقاية من هذا المرض استعمال اصول مقاومة لهذا المرض والاصول الغير حساسة هي فولكاماريانا، مايور، كليوبترا، ماندرين
- ملاحظة هامة:- في المناطق المصابة بهذا المرض يمن استعمال الخشخاش كاصل لانه حساس جدا للإصابة بهذا المرض

ذبابة البحر الابيض المتوسط

الضرر ومظهر الإصابة:-

تقوم الذبابة بوخز قشرة الثمار واللب بجهاز وضع البيض والتي تسبب عفن المنطقة فتتلون باللون الاصفر المخضر او الاصفر الباهت في منطقة الإصابة في مساحة مستديرة وعند الضغط عليها باليد يخرج سائل مع جزء من اللب وتصبح المنطقة طرية وبعد ذلك تدخل الفطريات المختلفة المنطقة المصابة فتسقط الثمار وتتعفن وقد لاتسقط الثمار في هذه الحالة لاتتحمل النقل والتخزين

المكافحة:-

الطرق الزراعية:-

- 1-عدم زراعة اكثر من نوع اشجار الفاكهة في بستان واحد
- 2-جمع الثمار المتساقطة اولا باول واعدامها للتخلص من اليرقات الموجودة وبالتالي تقليل الإصابة

3-زراعة اصناف مقاومة نسبيا لهذه الافة

الطرق الكيميائية:-

- استخدام طعوم سامة تتكون من ملاثيون (125سم+1000) سم بومينال وازافة ماء الى المرش الى ان يصل الحجم الكلي الى 10 لتر ويخلط جيدا
- تكفي هذه المعاملة الى 5 دونم من الحمضيات
- يتم الرش بشكل بقع على الاشجار على الجزء الورقي بمعدل رشتين على كل شجرة (الجهة الجنوبية لكل شجرة من اشجار الحمضيات) ويكون سطرًا بعد سطر
- يتم اعادة عملية الرش مرة كل 10 ايام ويختلف عدد المعاملات حسب نوع المحصول كما هو

موضح في الجدول التالي

نوع الحمضيات

عدد المعاملات

الكلمنتينا

9معاملات ابتداء من شهر ايلول

المندلينا

6معاملات في الموسم

ابو صرة

7معاملات في الموسم

شموطي

9معاملات في الموسم

فلنسيا

14معاملة في الموسم

•لتحديد ومعرفة الموعد المناسب للرش يمكن استخدام المصائدالصفراء المحتوية على مادة لاصقة

حشرة فلوريدا الشمعية والحشرة القشرية الحمراء

اعراض حشرة فلوريدا الشمعية -1تبدو الاشجار ضعيفة

-2خطوط صفراء على الاوراق

-3اصفرار مواضع الاصابة على الثمار مع تشوه شكل الثمار وعدم وصولها للحجم الطبيعي

اعراض الحشرة القشرية الحمراء

•تتواجد هذه الحشرات على السطح العلوي للاوراق او على الثمار والافرع الصغيرة والكبيرة مما يعيق عملية التنفس

•وجود بقع دائرية صغيرة بلون محمر كذلك ظهور بقع صفراء على الاوراق حول اماكن وجود الحشرة تتسع وتتحد هذه البقع حتى يصبح لون الاوراق اصفر ثم بني وتجف وتسقط

•تكون الثمار الناضجة صغيرة غير قابلة للتسويق

•اذا كانت الاصابة شديدة تجف الاغصان وتموت الشجرة

المكافحة:-

الطرق الزراعية

-1عدم زراعة عوائل للحشرة في مكان واحد

-2ترك مسافات للتهوية بين الاشجار

-3ازالة الحشائش والاوراق المتساقطة والثمار المتساقطة

الطرق الكيميائية

العلاج الصيفي:-

شهر 6 حتى نهاية7

ملاثيون 57بمعدل 3سم/لتر ماء او اكنك 50بمعدل 1.5سم/لتر مخلوطة مع زيوت معدنيةمثل

فيتول / ليونيولا/ نريتويلاز/ سترونا

العلاج الشتوي:-

الاصابة العادية :- ينصح باستخدام الزيوت المعدنية

الاصابة الشديدة :- يستخدم مخلوط مع مبيدات فسفورية خاصة في نهاية الخريف

او 2%زيت معدني+ملاثيون 57بمعدل 1.5سم/لتر ماء

2%زيت معدني+ تتليك 50 معدل 1سم/لتر

بحيث يجب تغطية الشجرة كاملا مع مراعاة عدم الرش وقت التزهير او عقد الثمار وعدم جمع

المحصول الا بعد مضي 30 يوم من العلاج

امور يجب مراعاتها عند عملية الرش •تغطية النبات بشكل كامل بالزيت المعدني مع اعادة عملية الرش بعد 10 ايام من الرشة الاولى

•يجب ملاحظة ان الزيوت المعدنية لها فاعلية في مكافحة المن – الذبابة البيضاء – العناكب وغيرها من الافات كما ان تأثيرها محدود على الاعداء الطبيعية

•يفضل استخدام الزيوت عند درجة حرارة ما بين 7.5-30 م وعدم رشها على النباتات الضعيفة التي تعاني من الامراض والجفاف

حجم محلول الرش:-

تكافح هذه الافات باستخدام كمية كبيرة من محلول الرش

حجم الشجرة

صغير

متوسط

كبير

حجم محلول الرش لتر/ دونم

500لتر

700لتر

1000لتر

بينما تحتاج الافات مثل المن –البق الدقيقي- التربس

حجم الشجرة

صغير

متوسط

كبير

حجم محلول الرش لتر/ دونم

200لتر

300لتر

500لتر

الاعداء الطبيعية للحشرات القشرية والبق الدقيقي

الدبور- حشرة ابو العيد – الخنفساء – شبكية الاجنحة – الحلم المفترس

العناكب الحمراء

الضرر:-

تتغذى هذه الآفات على أوراق الأشجار مفضلة الأوراق ذات اللون الأخضر الداكن والكبيرة وكذلك على اللحاء الأخضر الغض والثمار الصغيرة .ونتيجة التغذية تظهر آثار التغذية على السطح العلوي للأوراق على شكل خدوش ويصاحبها تجعد والتواء حواف الأوراق إلى الداخل. في حالة

الإصابة الشديدة وخاصة في الأشجار التي تعاني من نقص في العناصر الغذائية والجفاف قد تؤدي الإصابة إلى سقوط الأوراق وتساقط الثمار الصغيرة بالإضافة إلى موت وجفاف الأفرع.

كيفية انتشار عناكب الحمضيات:

تنتقل هذه الآفات من شجرة إلى أخرى وداخل الشجرة الواحدة بالعديد من الوسائل منها:

1-حركة الآفة لمسافة محدودة بين الأوراق بحثاً عن الغذاء.

2-بواسطة الرياح والأمطار.

3-بواسطة الطيور والحشرات.

4-الإنسان والأدوات المستخدمة في العمليات الزراعية.

5-في المشاتل، قد تنتقل بواسطة استخدام المطاعيم الموبوءة.

المكافحة:-عمليات الرش:-

1-إن معظم عناكب الحمضيات لا ترى بالعين المجردة، لذلك فإن الاعتماد على ظهور أعراض الإصابة للبدء بعملية مكافحة الكيماوية غالباً ما تكون متأخرة. لذا يجب مراقبة ظهور الآفة عن طريق الكشف الدوري باستخدام العدسة المكبرة وخاصة في الأوقات التي تناسب حدوث الإصابة. يجب التركيز في عمليات المراقبة على الأشجار التي تمت معاملتها بالمبيدات الحشرية مؤخراً.

2-إن استخدام المبيدات الكيماوية عند حدوث إصابة طفيفة بالعناكب تكون بدون أية جدوى اقتصادية وتزيد من تكاليف الإنتاج بالإضافة الى تأثيرها على الأعداء الحيوية المختلفة الموجودة في البستان.

3-إذا وجدت الإصابة بشكل كبير على الأشجار في مناطق معينة من البستان فيجب معاملة تلك المناطق فقط على أن يكون الرش شاملاً لجميع أجزاء الشجرة وبضغط عالي (تغطية كاملة).

4-عند اللجوء الى استخدام المبيدات الكيماوية فينصح الرش بأحد المواد الآتية مع رش قلب الأشجار من الداخل وتغطية الأشجار تغطية كاملة بمحلول الرش:

نيرون 0.5 سم/ لتر الماء
مارشال 25 / 0.5 سم/ لتر الماء
فيرتمك 0.5 سم /لتر الماء

حشرة المن

الضرر ومظهر الإصابة:

1.تشاهد حشرات المن على السطح السفلي للأوراق الغضة الحديثة والبراعم الطرفية حيث تقوم بامتصاص عصارة النبات مما يؤدي إلى اصفرار الأجزاء المصابة

2.إفراز المادة العسلية والتي تنمو عليها فطريات العفن الأسود(الشحبار) فتقلل من كفاءة التمثيل الضوئي وبالتالي نقص الغذاء مما يؤدي إلى ضعف نمو النبات وبالتالي الثمار تكون صغيرة الحجم.

3.يقوم بنقل كثير من الأمراض النباتية وخاصة الفيروسية وخاصة مرض التدهور السريع (الترستيذا).

المكافحة:- :

الطرق الزراعية:-

تنظيف الأرض من الحشائش وتنظيم عمليات الري وتحسين الصرف وإزالة الأفرع المصابة أصابة شديدة في حالة تجدد أوراقها

الطرق الكيميائية:-

عند وصول الحشرة إلى أعداد كبيرة على النموات الحديثة يوصى الرش بأحد المبيدات الآتية والتبادل في حالة الرش بأكثر من مبيد

دورسبان 1سم/لتر ماء
سوبرا سيد 1.5 سم/لتر ماء

البق الدقيقي الأسترالي

الضرر ومظهر الإصابة:

تصيب الأغصان الغضة وتمتص عصارة النبات مما يؤدي الى اصفرار الاجزاء المصابة فيضعف نموه وقد يموت وتفرز الندوة العسلية في مناطق الإصابة وينمو عليها فطر العفن الأسود (الشحبار) الذي يقلل من كفاءة عملية التمثيل الضوئي فيضعف النبات وينقص حجم الثمار كما تصبح غير صالحة للتسويق.

المكافحة:- :

الطرق الزراعية:-

إزالة الحشائش المجاورة أو المنتشرة بين أشجار الحمضيات وإزالة أفراد هذه الحشرة وما تحمله من أكياس البيض بتنظيف مكان الإصابة بقطعة مبلة بالكيروسين، كذلك تقليم

الاشجار المصابة وحرق نواتج التقليم والاوراق والثمار المتساقطة على الارض
الطرق الكيميائية: -

الرش بأحد المبيدات الآتية والتبادل في حالة الرش بأكثر من مبيد:

دورسيان 1 سم3/ لترماء

سوبرسيد 1.5 سم3/ لترماء نفس علاج حشرة فلوريدا الشمعية والحمراء علاج صيفي وعلاج
شتوي.

حافرة انفاق اوراق الحمضيات

الاعراض والاضرار

1-تتغذى اليرقات على الانسجة ما بين بشرتي الورقة مما يؤدي الى تغير لون المنطقة المصابة

الى اللون الفضي ومن ثم الى اللون الاصفر الشاحب ومن ثم تموت وقد تتساقط الاوراق

2-مع تقدم الإصابة تجف المنطقة المصابة على الاوراق وتتلّفها مما يؤثر على التمثيل الضوئي

3-تهاجم الحشرة الافرع الغضة والنموات الخضراء والبراعم القمية والابطية مما تؤثر على

استطالة الافرع ونمو الشجرة

4-بالإصابة الشديدة تهاجم الحشرة الثمار الصغيرة وتحفر انفاقا بداخلها وبالتالي تؤدي الى

دخول حشرات المن والبق الدقيقي والعناكب

المكافحة:-

الطرق الزراعية:-

• ازالة الاوراق المصابة

• ازالة النموات الحديثة المبكرة والمتاخرة

• تنظيم عملية الري الذي يقلل من ظهور نموات طرية حساسة للإصابة

• ازالة السرطانات والافرع المائية التي تنمو حول الشجرة

• اجراء تقليم متوازن خلال موسم التقليم والابتعاد عن التقليم الجائر لان ذلك يشجع الشجرة على

النمو الخضري الكثيف

• التسميد المتوازن للتقليل من النموات الحديثة في الفترات التي تكون فيها اعداد الحشرة عالية

المكافحة الكيميائية:-

ترش الاشجار في اول الربيع باحدى المبيدات المناسبة ويكرر الرش بعد 10 ايام

ويتركز على النموات الحديثة وترش مرة اخرى في الخريف

فيرتمك 0.5 سم/ لتر ماء

ايفسكت 0.5 غم/ لتر ماء

المكافحة الحيوية:-

هناك العديد من الاعداء الطبيعية التي تهاجم هذه الافة وتتغذى عليها وبداخلها

المكافحة المتكاملة:-

يتم استخدام الطرق السابقة مع مراقبة ومسح البساتين خاصة بداية نمو الربيع (5-2) والنمو

الخريفي (11-9) لتحديد موعد الرش.

فاذا وجد 50% من الاشجار وقد اعطى نموات ورقية جديدة وان 30% اصيب منها ويجب البدء

بالمكافحة الكيميائية. وان 30% من النموات الحديثة بعد الرش بها انفاق فعالة يلزم الرش مرة

اخرى بمبيد اخر :ويجب ان يكون المبيد بالمكافحة المتكاملة اختياري اي يقتل الافة ولا يقتل

الاعداء الحيوية

الذبابة الصوفية البيضاء

الضرر والاعراض:-

تفرز اليرقات كميات كبيرة من الندوة العسلية مما تؤثر على الازهار والثمار، كذلك تقوم الحشرة

بامتصاص عصارة الخلايا من الاوراق مما يؤدي الى تساقطها واضعاف حيوية الشجرة ، حيث

ان اليرقات عند افرازها للندوة العسلية يؤدي ذلك الى نمو الفطر الاسود مسببا شحبار اسود يكثر

باشتداد الإصابة وبالتالي يقلل من نشاط التمثيل الضوئي.
المكافحة الحيوية:-

يقوم الطفيل **Cales noacki** بالتغذية على يرقات الذبابة.

المكافحة الكيماوية -1: استعمال الزيوت المعدنية مثل سترونا، فيتول ، لافينولا ، BCL معدل 1 - 1.5%

2-الرش باحدى المواد الكيماوية
ابلورد 0.5 سم / لتر ماء.
تايجر 1 سم / لتر.

انزع اص